

# OPTILAC®

Condroitín sulfato 3 % - Aprotinina 1,68 UI

**Solución oftálmica estéril**

Industria Argentina

Venta bajo receta

## FÓRMULA:

Cada 100 ml contiene:

Condroitín sulfato (sal sódica) 3,00 g, Aprotinina 1,68 UI,

Acido bórico 520,00 mg, Borato de sodio 20,00 mg,

Cloruro de sodio 680,00 mg, Timerosal 1,00 mg,

Agua destilada c.s.p. 100,00 ml.

## ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Tratamiento sintomático de la hiposecreción lagrimal y del ojo seco.

## CÓDIGO ATC:

S01XA

## POSOLOGÍA:

Una gota en el/los ojo/s afectado/s, 4-5 veces por día; el estado patológico de la enfermedad condiciona la duración del tratamiento.

## CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

## ACCIONES COLATERALES Y SECUNDARIAS:

En relación con la sensibilidad particular de las afecciones tratadas y en el curso de las primeras instilaciones, existe la posibilidad de hiperemia conjuntival y sensación de picazón que tiende a desaparecer luego de algunos días de tratamiento.

## SOBREDOSIFICACIÓN:

Aún no se han reportado casos en que haya sobredosis no tratada.

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez. (01) 4962-6666/2247  
Hospital A. Posadas. (011) 4654-7777 / 4658-7777

## PRESENTACIÓN:

Envases conteniendo 10 ml.

**Conservar bien cerrado a temperatura ambiente menor a 25°C.**

**Se recomienda descartar luego de un mes de abierto el envase.**

**Evitar el contacto de la punta del gotero con el ojo y estructuras adyacentes o cualquier otra superficie, de lo contrario el producto puede contaminarse provocando infecciones oculares.**

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

Especialidad medicinal autorizada por el ministerio de Salud.  
Certificado: N° 43.766.

Fecha de última revisión: septiembre de 1994.



Laboratorios **RAYMOS SACI**

Cuba 2760 - Buenos Aires

Director Técnico: Carlos A. González - Farmacéutico