

DEPARTAMENTO

Nombre y Firma/
Name and Signature

Día/
Mes/
Año/
Day/
Month/
Year

DEPARTAMENTO

Nombre y Firma/
Name and Signature

Día/
Mes/
Año/
Day/
Month/
Year

DEPARTAMENTO

Nombre y Firma/
Name and Signature

Día/
Mes/
Año/
Day/
Month/
Year

DEPARTAMENTO

Nombre y Firma/
Name and Signature

Día/
Mes/
Año/
Day/
Month/
Year

DESARROLLO

Nombre y Firma/
Name and Signature

Día/
Mes/
Año/
Day/
Month/
Year

OPTILAC®
CONDROITÍN SULFATO 3 %
APROTIMINA 1,68 UI

Solución oftálmica estéril

Venta bajo receta

Industria Argentina

FÓRMULA:

Cada 100 ml contiene:
 Condroitín sulfato (sal sódica) 3,00 g; Aprotinina 1,68 UI; Ácido bórico 520,00 mg; Borato de sodio 20,00 mg; Cloruro de sodio 680,00 mg; Timersal 1,00 mg; Agua destilada c.s.p. 100,00 ml.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Tratamiento sintomático de la hiposecreción lagrimal y del ojo seco.

CÓDIGO ATC: S01XA

POSOLOGÍA:

Una gota en el/los ojo/s afectado/s, 4-5 veces por día; el estado patológico de la enfermedad condiciona la duración del tratamiento.

CONTRAINDICACIONES:


Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

ACCIONES COLATERALES Y SECUNDARIAS:

En relación con la sensibilidad particular de las afecciones tratadas y en el curso de las primeras instilaciones, existe la posibilidad de hiperemia conjuntival y sensación de picazón que tiende a desaparecer luego de algunos días de tratamiento.

SOBREDOSIFICACIÓN:

Aún no se han reportado casos en que haya sobredosis no tratada. Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comuníquese con los centros de toxicología:



538

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez. Tel: (011) 4962-6666 / 2247.
 Hospital A. Posadas. Tel: (011) 4658-7777 / 4654-6648.

PRESENTACIÓN:

Envases conteniendo 10 ml.

CONSERVAR BIEN CERRADO A TEMPERATURA AMBIENTE MENOR A 25° C.

SE RECOMIENDA DESCARTAR LUEGO DE UN MES DE ABIERTO EL ENVASE.

EVITAR EL CONTACTO DE LA PUNTA DEL GOTERO CON EL OJO Y ESTRUCTURAS ADYACENTES O CUALQUIER OTRA SUPERFICIE, DE LO CONTRARIO EL PRODUCTO PUEDE CONTAMINARSE PROVOCANDO INFECCIONES OCULARES.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
 Certificado N 43.766.


Fecha de última revisión: Septiembre / 1994.

Laboratorio Max Vision S.R.L.
 Ruiz Huidobro 2764, C1429DNT CABA, Argentina
 www.maxvision.com.ar

Directora Técnica: Sandra B. Casella, Farmacéutica.

4718601840
 538
 C.V. 2

max
 VISION



838

	SURCAN S.R.L. Alvarez Thomas 198 3° A Buenos Aires - C1427CCO Tel/Fax: 4553-2422 disenografico@surcan.com.ar www.surcan.com.ar	Laboratorio/Laboratory: MAX VISION	Tamaño/Size: ancho/wide: 80 mm alto/high: 120 mm	Fecha/Date: 09/MAY/23 Version N°: 2
		Producto/Product: OPTILAC Contenido/Content: SOLUCION País/Country: ARGENTINA	N° Material: 4718601840 Pharmacode N°: 538 Código visual/Visual code: 2	Guía de colores/Colours Guide Pantone Black C Colores/Colours: 1
Elemento/Item: PROSPECTO (FRENTE Y DORSO)				